

Препаратнинг савдо номи: Инфорин
Таъсир этувчи модда (ХПН): ибупрофен
Дори шакли: сиртга қўллаш учун суртма 10%

Таркиби:

Бир грамм крем қуйидагиларни сақлайди:
Фарм моддалар: ибупрофен 100 мг;
ёрдамчи моддалар: метилпарагидроксibenзоат, пропилпарагидроксibenзоат, глицерин (Е 422), пропилен гликоль, оқ юмшоқ парафин, глицерилстеарат, цетеарат-20, цетеарат-12, цетиариловый спирти, цетилпальмитат, суюқ парафин, цетил спирти, карбомер, натрий гидрооксиди, тозаланган сув.

Таърифи: оқ, бир хил таркибли, осон сингиб кетувчи крем
Фармакотерапевтик гуруҳи: ностероид яллиғланишга қарши воситалар
АТХ коди: M02AA13

Фармакологик хусусиятлари

Фармакокинетикаси
Инфорин препарати маҳаллий қўллаш учун мўлжалланган. Терига суртилганда ибупрофен тез ва сезиларли даражада (48 соат давомда якуний дозани тахминан 22%) тери орқали сингиди, юмшоқ тўқималарда, бўғимларда ва синовиал суюқликда муҳим аҳамиятга эга бўлган маҳаллий терапевтик концентрацияларга эришади, гарчи бу, кам ҳоллардан ташқари (ибупрофенга nisbatan юқори сезувчанлик), қандайдир тизимли ноҳўя самараларни пайдо бўлиши учун етарли эмас. Модда алмашинуви ёки моддаларнинг организмдан чиқиши борасида озгиз орқали қабул қилиш ва маҳаллий қўллаш йўллари ўртасида сезиларли фарқлар йўқ.
Фармакодинамикаси
Крем маҳаллий қўллаш учун мўлжалланган. Таркибида фаол модда фенолпропион кислотасининг ҳосиласи бўлган ибупрофен сақлайди, у простагландин-синтетаза ингибитори ҳисобланади, маҳаллий қўлланганда бевоcита яллиғланган тўқималарда оғриқ қолдирувчи ва яллиғланишга қарши таъсир кўрсатади.

Қўлланилиши

Умуртқа поғонасидаги оғриқлар билан боғлиқ, бод ревматик ва мушак оғриқлари, таранглашиши, чўзилиши, невралгия ва спорт машғулотларида олинган жароҳатлар билан боғлиқ оғриқ ва яллиғланиши энгиллаштириш учун қўлланади. Бўғимларнинг аҳамиятга оғриқларини энгиллаштириш учун мўлжалланган.

Қўллаш усули ва дозалари

Катталар ва 12 ёшдан катта болаларга, шунингдек, кекса ёшдаги шахсларга фақат сиртга қўллаш учун буюрилади. 50 дан 125 мг гача (2-5 см) суртилган ва жароҳатланган тери соҳасига тўлиқ сингинунича энгил ишқалаб сингдирилади. Заруриятга қараб такроран қўлланилади, кўпи билан бир кунда тўрт мартагача, ҳар бир қўллаш оралиғи камида 4 соатлик интервалга риоя этган ҳолда қўлланилади. Ҳар қўллашдан кейин кўпларни ювинг. Кўрсатилган дозадан оширманг. Агар даволашнинг икки ҳафтасидан кейин яхшиланиш кузатиломаса, шифокорга мурожаат қилиш зарур.
12 ёшдан кичик болалар
Хавфсизлик ва самарадорлик бўйича маълумотларнинг йўқлиги сабабли, 12 ёшдан кичик болаларга препаратни қўллаш тавсия қилинмайди.

Ноҳўя таъсирлари

Ибупрофен билан боғлиқ юқори сезувчанлик реакциялари:
x специфик бўлмаган аллергия ва анафилактик реакциялар;
x нафас йўллари томонидан юқори сезувчанлик реакциялари (астма, бронхоспазм ва ҳансираш);
x тошма, қичиш, эшакеми, пурпура ангионевротик шиш, кам ҳолларда буллёз дерматозлар (токсик эпидермал некролиз, қўп шакли эритма).
Меъда – ичак йўллари томонидан: қорин соҳасидаги оғриқ ва диспепсия.
Буйраклар томонидан: буйраклар функциясининг бузилиши беморда анамнез маълумотларига кўра юзага келиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

x ибупрофенга ва ёрдамчи моддаларга nisbatan юқори сезувчанлик;
x ацетилсалицил кислотасини ёки бошқа ностероид яллиғланишга қарши препаратларни қабул қилиш билан боғлиқ бронхал астма, бронхоспазм, ринит, эшакеми;
x жароҳатланган ёки яллиғланган тери;
x маҳаллий қўллаш учун бир вақтнинг ўзига терининг бир жойида бошқа дори воситалари билан бирга;
x ҳомиладорлик ва эмизиш даврида;
x 12 ёшгача бўлган болаларда қўллаш мумкин эмас.

Дори воситалари билан ўзаро таъсири

Ностероид яллиғланишга қарши препаратлар қон босимини пасайтирувчи, ва жуда кам ҳолларда маҳаллий қўлланганда, эҳтимол антикоагулянтлар таъсирини кучайтириш мумкин. Ацетилсалицил кислотаси ёки бошқа НЯҚВ (ностероид яллиғланишга қарши дори воситалари) билан бир вақтда қабул

қилганда ноҳўя ноҳўя реакцияларнинг ривожланиш хавфини ошириши мумкин.

Махсус кўрсатмалар

Кремни яллиғланган ёки ишқастланган терига суртилмайди. Қўллашдан олдин терининг кичик соҳасида сезувчанлигини текшириш зарур. Препаратни кўз ва шиллиқ пардага тушишдан сақланиш керак. Қизариш, қичиш, тошма ёки қутилиши мумкин бўлган аллергия реакцияларининг бошқа клиник белгилари пайдо бўлганда, препаратни қўллашни тўхтатиш ва даволашни давом эттириш бўйича мутахассисга маслаҳат учун мурожаат қилиш лозим. Крем суртилган соҳага окклюзион боғлов (ҳаво ўтказмайдиган) қўйиш мумкин эмас. Агар улар даволаш объекти бўлмаса Инфорин препаратини қўлагандан кейин, қўпларни доим ювиш керак. Перорал НЯҚВ, шу жумладан ибупрофенни, айрим ҳолларда буйрак етишмовчилиги, фаол пептик яраларни ўзғариши билан боғлиқ бўлиши мумкин ва берилувчан асмастик пациентларда аллергия бронхал реакцияни чиқариши мумкин. Гарчи маҳаллий қўлланиладиган ибупрофеннинг тизимли сўрилиши перорал қабул қилинадиган дори шакллари учун nisbatan камроқ, шубҳасиз асосларга кам ҳолларда пайдо бўлиши мумкин. Шу сабабларга кўра, фаол пептик яраси бўлган, буйрак функцияси бузилишига ёки асмаси бўлган пациентлар, бошқа оғриқ қолдирувчи воситаларни қабул қилувчи пациентлар каби, ибупрофен кремни қўллашдан олдин тиббий ёрдамга мурожаат қилишлари керак. Пациентлар кузатилиши мумкин бўлган ёруғликка сезувчанлиқдан сақланиш учун, ишлов берилган соҳага қўёш нурлари хаддан зиёд таъсир қилишига йўл қўймаслик керак.
Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида.
Ҳомиладорлик ва эмизиш даврида фойдаланиш мумкин эмас.
Дори воситасининг автотранспорт ва потенциал хавфдаги механизмлари бошқариш қобилиятига таъсир қилишининг ўзига хос хусусиятлари
Автомобилни бошқариш ва ҳаракатланувчи механизмлар билан ишлаш қобилиятига таъсир қилмайди.

Дозанинг ошириб юборилиши

Препаратни маҳаллий қўллаганда дозани ошириб юборилиши эҳтимоли жуда кам.
Ибупрофеннинг дозасини ошириб юборилиши симптомлари (тасодифан озгиз орқали қабул қилганда): бош оғриғи, қусиш, уйқучанлик, гипотензия.
Даволаш: ичга қабул қилганда меъдани ювиш ўтказилади, қайт қилдириш, фаоллаштирилган кўмир ичиш, симптоматик даволаш, зарур бўлганда электролит nisbati бир марома келтирилади. Махсус антидоти номалум.

Чиқарилиш шакли

Бирламчи ўрам: 50 г дан препарат алюмин тубаларга жойлаштирилган.
Иккиламчи ўрам: 1 тубадан давлат ва рус тилидаги тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон қутида жойланган.

Сақлаш шароити

25 °C юқори бўлмаган ҳароратда, оригинал ўрамда сақлансин. Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик мuddати

4 йил.
Яроқлилик мuddати ўтган қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Руххатдан ўтказилганлик гувоҳномаси

ва савдо белгисининг эгаси
SPEY MEDICAL Ltd.,
Лондон, Буюк Британия

Ишлаб қарувчи

REPLEK FARM Ltd. Skopje,
Скопье, Македония

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида махсуслотнинг сифати бўйича истеъмолчилардан мулоҳазаларни қабул қилишчи ташкилотнинг манзили:
"Ameliya Pharm Service" МЧЖ,
Ўзбекистон, Тошкент ш., 100015, Ойбек кўч., 36,
тел: +998 78 150 50 81, +99878 150 50 82.
e-mail: uzdrugsafety@eviolet.co.uk