



ЛАКТОСПЕЙ ЭНТЕРО

Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства

Торговое название препарата: Лактоспей Энtero

Действующие вещества (МНН):

Комплекс эубиотических микробов компонентов нормальной кишечной микрофлоры: *Bifidobacterium bifidum I*, *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus plantarum*, *E-Coli M-17*, *Enterococcus faecium*.

Лекарственная форма: капсулы

Состав:

1 капсула препарата содержит:

активные вещества: суммарно не менее 100 миллионов (10^8) живых пробиотических микробов в т.ч бифидобактерий не менее 10 миллионов (10^7), лактобактерий не менее - 10^7 , кишечной палочки *E-Coli M-17* не менее - 10^7 и энтерококков фагиум не менее - 10^7 .

вспомогательные вещества: инулин, крахмал.

Описание: желатиновые капсулы размером «01» цвета слоновой кости.

Фармакологическая группа: Антидиарейные микроорганизмы.

Код АТХ: A07FA

Фармакологические свойства

Лечебный эффект Лактоспей Энtero а обусловлен антагонистическим действием микробных клеток препарата по отношению к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам кишечника. Высокий качественный уровень нормальной микрофлоры кишечника и ее преобладание в микробиоценозе, достигаемые при применении Лактоспей Энtero а, нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшают обменные процессы, препятствуют формированию затяжных форм кишечных заболеваний, повышают неспецифическую резистентность организма.

Биологически активные пищевые добавки ФОС и инулин, входящие в состав препарата, поступают в неизменном виде в нижнюю часть ЖКТ, а именно в толстую кишку, где являются дополнительными субстратами для микробов-компонентов препарата и потенцируют их рост. Также оказывают положительный эффект на перистальтику кишечника.

Показания к применению

Лактоспей Энtero предназначен для лечения взрослых и детей старше трех лет, страдающих следующими заболеваниями желудочно-кишечного тракта:

Дисбактериозы различной этиологии, в том числе возникающие в результате применения антибиотиков и сульфаниламидных препаратов;

Острый и хронический гастроэнтероколиты;

Дисфункции кишечника или выделение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов;

Реконвалесцентный период у больных, перенесших острые кишечные заболевания.

Способ применения и дозы

Лактоспей Энtero принимают внутрь, за 20-30 минут до еды, запивая капсулу небольшим количеством кипяченной воды комнатной температуры.

Взрослым назначают 3-4 капсулы в день, детям от 3 до 12 лет – 2 капсулы в день.

При назначении препарата детям младшего возраста, содержимое капсулы растворяют в 1-2 чайных ложках кипяченной воды комнатной температуры и тщательно перемешивают. Дети принимают полученную смесь, запивая небольшим количеством подслащенной воды или прохладного чая.

Длительность курса лечения Лактоспей Энtero ом определяется тяжестью клинических проявлений заболевания, возрастом больного и составляет 2-4 недели.

В профилактических целях, в зависимости от возраста, назначают от 1-2 капсулы в день в течение 5-10 дней.

Побочные действия

В первые дни приема препарата возможно постепенно исчезающее усиление метеоризма.

Противопоказания

Противопоказаний нет.

Лекарственные взаимодействия

Нежелательные эффекты при взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

Несовместимость данных нет.

Особые указания

Состорожностью назначать пациентам с лактазной недостаточностью.

Применение при беременности и период лактации

Противопоказаний нет.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не влияет.

Передозировка

Данных о возможной передозировке нет.

Форма выпуска

Блистерная упаковка по 10 капсул вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия хранения

Хранить в сухом, темном месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Фармацевтическая компания АО «Биофарм»

Грузия, Тбилиси, 0160, ул. Гогуа №3.

Тел./Факс: (+99532)225 29 56.

E-mail: biopharm@caucasus.net

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству

лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «Amelya pharm Service»

Узбекистан, г. 100015, Ташкент, ул. Ойбек 36, БЦ «East Line»

Тел.: +99878 150 50 81, +99878 150 50 82

E-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk.