



ТИБИЁТДА ҚўЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙўРИҚНОМА

Препаратнинг савдо номи: Лактоспей Энтеро

Таъсир этувчи моддалар (ХПН):

Нормал ичак микрофлорасининг зубиотик микроблар компонентлари мажмуаси: *Bifidobacterium bifidum*, *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus plantarum*, *E-Coli M-17*, *Enterococcus faecium*.

Дори шакли: капсулалар.

Таркиби:

1 капсула қуйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар: 100 миллиондан (10^8) кам бўлмаган тирик пробиотик микроблар йиғиндиси, шу жумладан 10 миллиондан (10^7) кам бўлмаган бифидобактериялар, 10^7 дан кам бўлмаган лактобактериялар, 10^7 дан кам бўлмаган ичак таёқчаси *E-Coli M-17* ва 10^7 дан кам бўлмаган энтерококк фацимум;

ёрдамчи моддалар: инулин, крахмал.

Таърифи: фил суяги рангли, “01” ўлчамли желатинли капсулалар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Диареяга қарши микроорганизмлар.

АТХ коди: A07FA.

Фармакологик хусусиятлари

Лактоспей Энтеро препаратининг даволовчи самараси препаратнинг микроб хужайраларини ичакнинг патоген ва шартли-патоген микроорганизмларига нисбатан антагонистик таъсири билан боғлиқ. Лактоспей Энтеро препарати қўланганда эришилладиган ичакнинг нормал микрофлорасини юқори микдорий даражаси ва микробиоценоздаги устунлиги, меъда-ичак йўлларининг фаолиятини нормallashtиради, алмашинув жараёнларини яхшилайди, ичак касалликларининг сурункали шакилларининг шаклланишига тўсқинлик қилади, организмнинг носпецифик резистентлигини оширади.

Препаратнинг таркибига кирувчи ёрдамчи моддалар ФОС ва инулин, МИЙ нинг пастки қисмига, хусусан, йўғон ичакка, ўзгармаган ҳолда тушади, у ерда препаратнинг компонентлари – микроблар учун қўшимча субстрат ҳисобланади ва уларнинг ўсишини потенциаллайди. Шунингдек ичакнинг перистальтикасига ижобий самара кўрсатади.

Қўлланилиши

Лактоспей Энтеро меъда-ичак йўлларининг қуйдаги касалликлари бўлган катталар ва 3 ёшдан ошган болаларни даволаш учун мўлжалланган:

Турли этиологияли дисбактериоз, шу жумладан антибиотаклар ва сульфаниламид препаратларини қўллаш натижасида пайдо бўлган;

Ўткир ва сурункали гастроэнтероколитлар;

Ичак дисфункцияси ёки патоген ва шартли-патоген микроорганизмларни чиқиши;

Ўткир ичак касалликларини ўтказган беморларда реконвалесцент даври.

Қўллаш усули ва дозалари

Лактоспей Энтеро препарати капсуласи ичга, овқатдан 20-30 минут олдин хона ҳароратидаги қайнатилган сувнинг катта бўлмаган микдори билан қабул қилинади. Катталарга кунига 3-4 капсула, 3 дан 12 ёшгача бўлган болаларга – кунига 2 капсуладан буюрилади. Препарат кичик ёшли болаларга буюрилганда капсула ичидাগиси 1-2 чой қошиқ хона ҳароратидаги қайнатилган сувда эритилади ва яхшилаб аралаштирилади. Болалар олинган аралашмани катта бўлган микдордаги ширинлаштирилган сув ёки салқин чой билан қабул қилади.

Лактоспей Энтеро препарати билан даволаш курсининг давомийлиги касалликнинг клиник кўринишларини оғирлиги, беморнинг ёши билан белгиланади ва 2-4 ҳафтани ташкил қилади.

Профилактика мақсадида, ёшга қараб, кунига 1-2 капсуладан 5-10 кун давомида буюрилади.

Ножўя таъсирлари

Препаратни қабул қилишни биринчи кунларида аста-секин ўтиб кетувчи метеоризм кучайиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Қўллаш учун қарши кўрсатмалари йўқ.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсирида нуқуш самаралар мавжуд эмас. *Номутаносиблик* – маълумотлар йўқ.

Махсус кўрсатмалар

Лактаза етишмовчилиги бўлган пациентларга **эҳтиёткорлик билан буюриши керак**.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши

Қарши кўрсатмалар йўқ.

Автомобилли ва мураккаб механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошириб юборилиши бўйича маълумотлар йўқ.

Чиқарилиш шакли

10 капсуладан блистер ўрамда тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон қутида.

Сақлаш шароити

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик мuddати

2 йил.

Яроқлилик мuddати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи

“БИОФАРМ” АЖ фармацевтик корхонаси

Тбилиси, Грузия, 0160, ул. Готуа №3.

Тел./Факс: (+99532)225 29 56.

E-mail: biopharm@caucasus.net

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида махсусотнинг сифати

бўйича истеъмолчилардан эътирозларни қабул қилувчи ташкилотнинг манзили

“Ameliya pharm Service” МЧЖ

Ўзбекистон, 100015, Тошкент ш., Ойбек кўч., 36, “East Line” БМ.

Тел.: +99878 150 50 81, +99878 150 50 82

E-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk.