

ГЕРВЕТИН

ТИББИЁТДА ҚўЛЛАНИЛИШИГА ДОИР Йўриқнома

«MA'QUILLANGAN»
O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi
Farmatsevtika tarmog'ini
rivojlantirish agentligining
«Dori vositalari, tibbiy buyumlar va
tibbiy texnika ekspertizasi
va standartlashtirish
davlat markazi» DUK
6.08.2018 y. №19

Препаратнинг савдо номи:
Герветин

Таъсир қилувчи модда (ХПН):
бензидамин

Дори шакли: томок ва оғиз бўшлиғи учун спрей

Таркиби:

1 мл спрей куйидагиларни сақлайди:

фаол модда: 1,5 мг бензидамин гидрохлориди;
ёрдамчи моддалар: метилпарагидроксibenзоат, глицерол, этанол 96%, натрий сахаринат, натрий гидрокарбонат, полисорбат 60, ялпиз ароматизатори (суяқ), хинолин сариқ бўёвчиси 70 Е (104), индиготин бўёвчиси 85 Е (132), тозаланган сув.

Фармакотерапевтик гуруҳи:

ЛОР-амалиёти ва стоматологияда маҳаллий қўллаш учун НЯҚВ.

АТХ коди: A01AD02.

Фармакологик таъсири

Фармакодинамикаси

Бензидамин индазоллар гуруҳига мансуб бўлиб, ностероид яллиғланишга қарши препарат ҳисобланади. Препарат яллиғланишга қарши, оғриқсизлантирувчи, маҳаллий оғриқ қолдирувчи ва кенг таъсир доирали микроорганизмларга қарши антибактериал таъсир кўрсатади. Капиллярлар ўтказувчанлигини камайтиради; ҳужайра мембранасини барқарорлаштиради, АТФ ва оксидланиш фосфорланиш жараёнларидаги бошқа макроэргик бирикмаларни ишлаб чиқарилишини тормозлайди. Препаратнинг яллиғланишга қарши ва мембранани барқарорлаштирувчи таъсири простагландинларни, гистаминни, брадикининни, цитокининларни, комплемент омиллари ва бошқа носпецифик шикастловчи омиллар синтезини тормозлаши ва фаолсизлантириши билан боғлиқ. Оғриқсизлантирувчи ва маҳаллий оғриқ қолдирувчи таъсири алькоген хусусиятига эга бўлган биоген аминларнинг концентрациясини билвосита камайтириши ва рецептор аппаратнинг оғриқ бўсағаси сезувчанлигини ошириши билан боғлиқ; бензидамин шунингдек тўқима рецепторлари билан брадикининни ўзаро таъсирини блоклайди, яллиғланиш ўчоғида қон айланишини қайта тиклайди ва оғриқ сезувчанлигини камайтиради. Бензидамин микроорганизмларнинг мембраналари орқали тез ўтиши қobiliяти туфайли антибактериал ва специфик микробларга қарши таъсир намоён қилади ва микроорганизм ҳужайраларидаги метаболик жараёнларни бузиб ва ҳужайра структурасини шикастлаб, ҳужайранинг лизисини (парчаланшини) чақиради.

Препарат Candida Albicans га нисбатан замбуруғларга қарши таъсирга эга. У ҳужайра деворини ва мицетларнинг метаболик занжирини структурали бузилишини чақириб, замбуруғларнинг репродукциясига тўсқинлик қилади. Препарат маҳаллий қўлланганда шиллиқ қаватлар орқали яхши сўрилади ва яллиғланган тўқималарга ўтади. Бензидаминни бошқа химиотерапевтик препаратлар билан даволаш схемасига киритиш даволашнинг самарадорлигини аҳамиятли даражада оширади ва даволаш муддатини қисқартиради.

Фармакокинетикаси

Препарат маҳаллий қўлланганда шиллиқ қаватлар орқали яхши сўрилади ва яллиғланган тўқималарга ўтади. Метаболитлар кўринишида буйрак орқали чиқарилади.

Қўлланилиши

Оғиз бўшлиғини ва ЛОР-аъзоларини яллиғланиш касалликлари:

- гингивит, глоссит, стоматит (шу жумладан нур билан даволаш ва химиотерапиядан кейин);
- ангина, фарингит, ларингит, тонзиллит;
- кандидоз (мажмуавий даволаш таркибида);
- сулак ёши безининг калькулёз яллиғланиши;
- жаррохлик аралашувлари ва жароҳатлардан (шу жумладан тонзиллэктомия, жағларни синиши) кейин;
- тишларни даволаш ёки олиб ташлагандан кейин;
- пародонтоз;

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- препаратнинг компонентларидан бирортасига юқори сезувчанлик;
- 3 ёшгача бўлган болалар ёши.

Қўллаш усули ва дозалари

Катталар ва кекса ёшли беморлага ҳар 1,5-3 соатда 4-8 дозадан буюрилади.

6-12 ёшлардаги болаларга: ҳар 1,5-3 соатда 4 дозадан.




3-6 ёшлардаги болаларга: ҳар 1,5-3 соатда 1-4 дозадан (максимал - 4 доза).

- Флаконни вертикал ҳолатда қўйинг, қалпоқчанинг учини тепага қутаринг флаконга нисбатан 90° бурчак остига.
- Учликни оғиз бўшлиғига киргазинг ва қалпоқча устидан

(расмда стрелка билан кўрсатилган) тавсия этилган дозага мувофиқ бир неча марта босинг. Икки босишлар орасидаги давр камида 5 секунд бўлиши керак.

3. Учликни диққат билан ҳолатга қайтаринг.

Диққат: биринчи марта қўллашдан олдин пуркагични бир неча марта ҳавога босинг.



Шифокорнинг барча кўрсатмаларига риоя қилинг, шифокор билан маслаҳатлашмасдан даволашни тўхтатманг ва дозани ўзгартирманг. Агар Сиз препарат қабулини ўтказиб юборган бўлсангиз, иложи борица тезроқ ўтказиб юборилган дозани қабул қилинг. Агар кейинги қабул вақтига яқин қолган бўлса, у ҳолда ўтказиб юборилган дозани қўппаманг, одатдаги схема бўйича қабулни давом эттиринг.

Тавсия этилган дозани оширманг!

Ножўя таъсирлари

Баъзида аллергия реакциялар пайдо бўлиши мумкин, улардан айримлари тез-тез учрайди: тери тошмаси, фотосенсибилизация, қичишиш ва уртикария. Маҳаллий реакциялардан увишиш ёки ачишиш ҳисси, оғизни қуриши кузатилади.

Доза ошириб юборилиши

Ҳозирги вақтга қадар Герветин препаратини дозасини ошириб юборилиш ҳоллари тўғрисида хабар берилмаган. Агар Сиз тавсия этилган дозадан юқори дозани қабул қилган бўлсангиз, дарҳол оғизни етарли миқдордаги сув билан чайиб ташланг, ножўя реакциялар пайдо бўлганида даволовчи шифокорга мурожаат қилинг.

Бошқа дори воситалари билан ўзаро таъсири

Аниқланмаган.

Махсус кўрсатмалар

Герветин препарати билан даволашни 7 кундан ошириш керак эмас, шифокор тавсиялари бўйича ҳолатлар бундан мустасно.

Препарат автомобилни бошқариш қobiliятига ва юқори диққатни талаб қилувчи бошқа фаолият турларига таъсир кўрсатмайди.

Инфекцион-яллиғланиш касалликларда мажмуавий даволаш таркибида қўллаш лозим. Спрейни кўзга тушишидан сақланиш керак.

Ҳомиладорлик ва лактация даври

Препаратни ҳомиладорлик ва лактация даврида кўрсатмалар бўйича қўллаш мумкин.

Чиқарилиш шакли

30 мл дан дозаловчи қурилмаси билан пластик, оқ, тиниқ бўлмаган контейнерда. Ҳар бир контейнер тиббиётда қўлланилишига доир йўриқномаси билан бирга картон ўрамда.

Сақлаш шароити

25°С дан юқори бўлмаган ҳароратда, қуруқ, ёруғликдан химояланган жойда сақлансин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати

4 йил.

Музлатилмасин.

Яроқлилик муддати ўтгандан кейин ишлатилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Савдо маркази ва рўйхатдан

ўтказилганлик гувоҳномасининг эгаси:

SPEY MEDICAL Ltd.,

Лондон, Буюк Британия

Ишлаб чиқарилган:

REPLEK FARM Ltd. Skopje

Скопье, Македония Республикаси

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:

"Ameliya Pharm Service"МЧЖ

100015, Ташкент ш., Ойбек кўч. 36, БЦ "East line",

тел: +998 71 15050581, 1505082