

ФОЛИСПЕЙ FOLISPEY

Қўллаш бўйича йўриқнома

Препаратнинг савдо номи: Фолиспей
Таъсир этувчи модда (ХПН): фолат кислотаси
Дори шакли: ичга қабул қилиш учун таблеткалар
Таркиби:

Ҳар бир таблетка қуйидагиларни сақлайди:
фолат модда: 5 мг фолат кислотаси;
ёрдамчи моддалар: микрокритсталл целлюлоза, повидон, натрий кроскармеллоза, сувсиз коллоид кремний диоксида, магний стеарати, натрий лаурилсульфати.

Таърифи: сариқ-тўқ сариқ рангли, икки томонлама қаварик, дуματοқ таблеткалар

Фармакотерапевтик гуруҳи: витаминлар

АТХ коди: B03BB01.

Фармакологик таъсири

Фармакодинамикаси

Фолат кислотаси В гуруҳи витаминларига мансуб (Вс витамини, В₉ витамини). Одам организмда синтезланмайди; овқат билан тушади ва нормал ичак флораси томонидан ишлаб чиқарилади. Нуклеотидлар ва аминокислоталар алмашинувиининг бир қатор реакцияларида бир улперолли фрагментларни (метил, метилен, формула ёки метенли гуруҳлари кўринишида) ташилишини амалга оширувчи фермент тизимларининг кофактори сифатида иштирок этувчи тетрагидрофолат кислотасининг ўтмишдоши бўлиб ҳисобланади. пролиферация, дифференциация ва ҳужайраларни етиштиши, шу жумладан эритропоэз ва эмбриогенез жараёнларини бошқаришда муҳим роль ўйнайди.

Фармакокинетикаси

Ичга қабул қилинганда меъда-ичак йўлларидан, айниқса 12-бармоқ ичакнинг юқори соҳаларида ҳатто тропик спру фонда мальабсорбция синдроми мавдудлигида ҳам яхши ва тўлиқ сўрилади. Айни вақтда мальабсорбция синдромида овқатдаги фолатлар ёмон сўрилади. Қондаги максимал концентрацияси 30-60 минутдан кейин эришади. Плазма оқсиллари билан жадал бoғланади. Гематозенцефалик тўсиқ, йўлдош орқали ўтади ва кўрак сuti билан ажралади. Жигарда тўпланади ва тетрагидрофолат кислотасини (дигидрофолатредуктаза таъсири остида аскорбин кислотаси мавжудлигида) ҳосил қилиб метаболизмга учрайди. Асосан метаболитлари кўрнишида сийдик билан чиқарилади. Агар қабул қилинган доза фолат кислотасига бўлган суткалик эҳтиёждан аҳамиятли даражада юқори бўлса, ўзгармаган кўрнишида чиқарилади.

Қўлланилиши

Фолат кислотаси танқислиги билан боғлиқ ёки у билан кечувчи ҳолатларни олдини олиш ва даволаш:

- фолат кислотасини танқислиги фондида ривожланувчи анемияларни даволаш: мегалобласт анемия;
- дори воситалари ва ионлаштирувчи радиация қақирган анемия ва лейкопения;
- ичгичка ичак касалликлари, спру ва мальабсорбция синдроми билан боғлиқ анемия;
- ҳомиладорлик даврида, ҳомилада нерв найчасини ривожланиш нуқсонларини олдини олиш учун;
- фолат кислотаси антагонистлари (метотрексат, сульфаметоксазол-триметоприм мажмуаси), тиришишга қарши препаратлар (фенитоин, примидон, фенобарбитал) билан узоқ вақт даволаш;
- сурункали алкоголизмдаги анемияда қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари

Ичга қабул қилинади.

Фолат кислотасини танқислиги билан боғлиқ мегалобласт анемияни даволаш учун: суткада 5 мг (1 таблетка) дан 4 ой давомиди.

Ичгичка ичак касалликлари, спру ва мальабсорбция синдроми билан боғлиқ анемияда: суткада 15 мг гача. *Ҳомилада нерв найчасини ривожланиш нуқсонларини олдини олиш учун, хавф зурухи кирувчи аёлларда* препарат режалаштирилган ҳомиладорликдан 1 ой олдин ва сўнгга 1 уч ойлик давомиди кунига 5 мг дан буюрилади.

Мувофиқлаштирилмаган ёки қонқарсиз овқатланиш билан боғлиқ бўлган фолат кислотаси танқислигини олдини олиш учун препарат ҳар кuni 2.5-5 мг дан буюрилади. *Даволаш мақсадида* катталарга суткада 5 мг дан буюрилади. Даволаш курси давомийлиги – 20-30 кун.

Болаларга – ёшга қараб паст дозаларда буюрилади.

Фолат кислотасини танқислиги билан боғлиқ мегалобласт анемияни даволаш учун:

1-18 ёшдаги болалар: кунига 5 мг 4 ой давомиди; самарани бир маромда ушлаб турувчи доза ҳар 1-7 кунда 5 мг.

Гемолитик анемия, моддалар алмашинувини бузилиши: 1-12 ёшдаги болалар: 2,5 мг – 5 мг дан кунига бир марта, 12-18 ёшдаги болалар: 5-10 мг кунига бир марта.

Гемодиализда фолат кислотаси етишимовчилигини олдини олиш учун: 1-12 ёшдаги болалар: 250 мкг/кг (максимал 10 мг) кунига бир марта. 12-18 ёшдаги болалар: 5-10 мг кунига бир марта.

Ноқуя таъсирлари

Аллерик реакциялар: тери тошмаси, тери қичишиши,

бронхоспазм, эритема, гипертермия.

Меъда-ичак йўллари томонидан: анорексия, кўнгил айниши, қоринни дам бўлиши, оғизда аччиқ таъм.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- препаратнинг компонентларига юқори сезувчанлик;
- хавфли ўсмалар;
- В₁₂-танқис анемия;
- гемохроматоз;
- гемосидерозда қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Флорамфеникол, неомицин, полимиксинлар, тетрациклинлар билан бир вақтда қўлланилганда фолат кислотасини сўрилиши камаяди.

Анальгетиклар (узоқ вақт даволаш), тиришишга қарши препаратлар (шу жумладан фенитоин ва карбамазепин), эстрогенлар, перорал контрацептивлар фолат кислотасига бўлган эҳтиёжни оширади.

Фолат кислотасини қўллаш фенобарбитал, фенитоин ёки примидоннинг плазмадаги даражасини пасайтириши ва тутқаноқ хуружини қақирishi мумкин.

Антацидлар, колестирамин, сульфонамидлар (шу жумладан сульфасалазин) фолат кислотасини сўрилишини камайтиради.

Колестирамин ва фолат кислотаси бир вақтда қўлланилганда сўрилиши пасайиши ёки ўзгариши мумкин, шунинг учун колестераминдан 1 соат олдин ёки 4-6 соатдан кейин қабул қилиш керак.

Метотрексат, пириметамин, триамтерен, триметоприм дигидрофолатредуктазини ингибиция қилади ва фолат кислотасининг самарасини пасайтиради (уни қабул қилаётган пациентларга унинг ўрнига кальций фолинатини буюриш керак).

Махсус кўрсатмалар

Пернициоз анемияда препарат мустақил қабул қилинмайди, балки цианокобаламин (В₁₂ витамини) билан бирга қабул қилинади. Фолат кислотасини юқори дозалари қўлланилганда, шунингдек узоқ вақт даволаганда В₁₂ витамининг концентрасияси пасайиши мумкин. Препарат болалар оломлайдиган жойда сақлансин ва яроқлилик муддати ўтгач ишлатилмасин.

Дозани ошириб юборилиши

Фолат кислотасининг дозасини ошириб юборилишининг исботланган хабарлари таърифланмаган. Фолат кислотаси нисбатан токсик бйрикма бўлиб ҳисобланмайди. Физиологик доза оширилганда фолат кислотаси меъда-ичак йўллари томонидан бузилишлар: қусиш, қоринни дам бўлиши, метеоризм, шунингдек туғни уйқуну бузилиши кўринишида носпецифик реакция қақирishi мумкин.

Доза ошириб юборилганда даволаш симптоматик ва тутиб турувчи ҳисобланади ва клиник кўринишларга қараб белгиланади. 1-2 соатдан кейин аниқланадиган препаратни ҳаддан ташқари кўп миқдорда қабул қилган ҳолларда меъдани қувиш ёки қувишини қақирувчи препаратлар буюрилади. Фолат кислотасини жигар ички циркуляциясини камайтириш мақсадида кўп марта фоллаштирилган кўмир қабул қилиш керак.

Чиқарилиш шакли

Қуруқ, ёруғлидан ҳимояланган жойда, 25°С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Сақлаш шароити

Қуруқ, ёруғлидан ҳимояланган жойда, 25°С дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.

Яроқлилик муддати

3 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Савдо номи ва рўйхатдан ўтказилганлик

гүвоҳномазининг эгаси

Spey Medical Ltd.,

Лондон, Буюк Британия

Ишлаб чиқарилган

РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье

Скопье, Македония Республикаси

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори

воситаларнинг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар)

ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили

«Ameliya Pharm service» ММҲ

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Ц-6, Юнусобод тумани, 92/2.

Тел.: (+998) 71 2356501