

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

Торговое название препарата:

Лилайз Роза

Действующее вещество (МНН):

гиалуроновая кислота

Лекарственная форма:

суппозитории вагинальные

Состав:

Каждый суппозиторий содержит:

Натрия гиалуронат (эквивалентно гиалуроновой кислоте 5 мг)	5,90 мг
Massa suppositoie A (твердый жир)	1847,70 мг
Масляный экстракт центеллы азиатской	20,00 мг
Жирорастворимый экстракт алоэ	60,00 мг
Масляный экстракт календулы	60,00 мг
Эфирное масло чайного дерева	2,00 мг
Бутилированный гидрокситолуол (БНТ)	0,40 мг
Пропилпарагидроксibenзоат	1,00 мг
Изобутилпарагидроксibenзоат	1,00 мг
Бутилпарагидроксibenзоат	2,00 мг

Описание:

белые или почти белые суппозитории без запаха.

Фармакотерапевтическая группа:

Стимулятор трофики тканей и регенерации.

Код АТХ: D03AX05

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Механизм действия

Способствует быстрой регенерации и реформированию слизистой оболочки влагалища. Гиалуроновая кислота представляет собой мукополисахаридный натуральный полимер, который является важным интерстициальным компонентом соединительной ткани. Её физико-химические свойства способствуют взаимодействию с другими молекулами и клетками, что делает присутствие гиалуроновой кислоты исключительно важным в ряде биологических процессов. Гиалуроновая кислота образует с молекулами воды дисперсионный матрикс, который играет важную роль в поддержании тонуса кожи и её эластичности. С другими молекулами протеогликанов, гиалуроновая кислота стабилизирует межклеточную массу соединительной ткани. Физико-химические свойства гиалуроновой кислоты в области раны создают физиологические условия, способствующие её заживлению.

Показания к применению

- атрофический вагинит;
- улучшение процессов регенерации в послеродовом периоде;
- после проведения хирургических операций во влагалище;
- после криодеструкции;
- при дистрофических изменениях, после лучевого лечения;
- при атрофических явлениях после гистеро- и овариэктомии, а также длительном приеме кортикостероидов и оральных контрацептивов.

Способ применения и дозы

Вагинально. Продолжительность применения обычно составляет 30 дней, но может быть продлена в соответствии с указаниями врача. Перед введением необходимо вымыть руки, освободить вагинальные суппозитории (разрезав ножницами упаковку). Вводить вагинальные суппозитории глубоко во влагалище. Если вагинальные суппозитории слишком мягкие, необходимо предварительно охладить их в холодильнике в течение нескольких минут или подержать под холодной водой (до извлечения их из пластиковой упаковки). Обычная дозировка составляет один вагинальный суппозиторий в день, вечером перед сном (или согласно указаниям врача). Нельзя принимать внутрь.

Побочные действия

Серьезные побочные эффекты не отмечались.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- злокачественные новообразования.

Лекарственные взаимодействия

Не изучалось.

Особые указания

Длительное применение средства, предназначенного для местного использования, может вызвать симптомы гиперчувствительности, в этом случае необходимо прекратить применение и проконсультироваться с врачом. Не глотать! Избегать контакта с глазами!

Применение при беременности и период лактации

При беременности проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность управлению автотранспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Не изучалось.

Форма выпуска

По 5 суппозитория в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлорида и полиэтилена.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец торговой марки и регистрационного удостоверения

Spey Medical Ltd., Великобритания

Производитель

HELP S.A., Греция

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО "Ameliya Pharm Service",
Республика Узбекистан, 100015, г. Ташкент, ул. Ойбек, 36,
Тел: +99871 150-50-81, 150-50-82
E-mail: ameliyapharm@gmail.com