

ЛИЛАЙЗ РОЗА

«MA'QULLANGAN»
O'zbekiston Respublikasi Sog'lom
saqlash vazirligi huzuridagi
Farmatsiye va tibbiy vositalar
agentligining «Dori vositalari, tibbiy buyumlar
valiboyi texnika ekspertiza» va
standartlashirish davlat markazi» DJK
18.08.2021 y. №15

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

Препаратнинг савдо номи:
Лилайз Роза

Таъсир этувчи модда (ХПН):
гиалурон кислотаси

Дори шакли:
вагинал суппозиторийлар

Таркиби:

Ҳар бир суппозиторий қўйдагиларни сақлайди:

Натрий гиалуронати (гиалуроник кислотага эквивалент 5 мг)	5,90 мг
Massa suppositoire A (қаттиқ ёр)	1847,70 мг
Осиё центелласи мойли экстракти	20,00 мг
Мой эритмали алоэ экстракти	60,00 мг
Календула мой экстракти	60,00 мг
Чой дарахти эфир мойи	2,00 мг
Бутиллаangan гидрокситолуол (БНТ)	0,40 мг
Пропилпарагидроксibenзоат	1,00 мг
Изобутиллапарагидроксibenзоат	1,00 мг
Бутиллапарагидроксibenзоат	2,00 мг

Таърифи:

оқ ёки деярли оқ хидсиз суппозиторийлар.

Фармакотерапевтик гуруҳи:

Тўқималарнинг трофизми ва регенерациясини
стимулятори.

Код АТХ: D03AX05

Фармакологик хусусиятлари

Фармакодинамикаси

Таъсир механизми

Қиннинг шиллик пардасининг тез тикланишига ва ўзгаришига ёрдам беради. Гиалуроник кислота мукополисахаридли табиий полимердир. Полимер бириктирувчи тўқиманинг муҳим интерстициал таркибий қисми саналади. Унинг физик ва кимёвий хоссалари бошқа молекулалар ва ҳужайралар билан таъсирни қўллаб-қувватлайди, бу эса биологик жараёнлар қаторида гиалуроник кислотанинг иштирокини ўта муҳимлаштиради. Гиалуроник кислота сувнинг молекулалари билан бирга тери фаоллиги ва унинг эластиклигини сақлашда муҳим ўрин тутадиган дисперсион матриксни ҳосил қилади. Протеогликанларнинг молекулалари билан бирга гиалуроник кислота бириктирувчи тўқиманинг ҳужайралараро массасини барқарорлаштиради. Жароҳат атрофида гиалуроник кислотанинг физик ва кимёвий хоссалари жароҳатнинг битишига ёрдам берадиган физиологик шароитларни ҳосил қилади.

Қўлланилиши

- атрофик вагинит;
- туғишдан кейинги даврда регенерация жараёнларининг яхшиланиши;
- қинда жарроҳлик операциялари ўтказилгандан кейин;
- криодеструкциядан кейин;
- нурли даволанишдан кейинги дистрофик ўзгаришларда;
- гистеро- ва овариозектомиядан кейинги атрофик ҳолатларда, шунингдек кортикостероидлар ва орал контрацептивлар узоқ вақт қабул қилинганда қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Вагинал. Қўллаш муддати одатда 30 кунни ташкил қилади, аммо шифокорнинг кўрсатмаларига биноан узайтирилиши мумкин. Препаратни юборишдан олдин қўлни яхшилаб ювинг, вагинал суппозиторийни чиқаринг (ўрамни қайчи билан кесган ҳолда). Вагинал суппозиторийни қин ичига чуқур киритинг. Вагинал суппозиторийлар жуда юмшоқ бўлиб қолган бўлса, бир неча дақиқа давомида музлаткичга солиб қўйинг ёки совуқ сувда тутиб туринг (пластик ўрамдан олишдан аввал). Вагинал суппозиторийнинг одатий дозаси кечқурунги уйку олдида (ёки шифокор кўрсатмасига биноан) кунига 1 марта. Ичга қабул қилинмасин.

Ножўя таъсирлар

Препаратнинг ҳеч қандай жиддий ножўя таъсирлари қайд этилмаган.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

- препарат таркибий қисмларига юқори сезувчанлик;
- ҳавфли ўсмада қўллаш мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Ўрнатилмаган.

Махсус кўрсатмалар

Маҳаллий ишлатиш учун мўлжалланган воситадан узоқ муддат фойдаланиш гиперсезувчанлик белгиларига сабаб бўлиши мумкин, ушбу ҳолатда қўлланилишини тўхтатиб, шифокор билан маслаҳатлашиш лозим. Ютилмасин! Кўзга тушишидан сақланинг!

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши

Ҳомиладорлик пайтида қабул қилишга тўғри келганда, шифокор билан маслаҳатлашинг.

Автотранспортни ҳайдаш ва механизмларни бошқариш қобилиятига таъсири

Препарат автотранспорт воситасини ёки потенциал ҳавфли механизмларни бошқариш қобилиятига таъсир қилмайди.

Дозани ошириб юборилиши

Ўрнатилмаган.

Чиқарилиш шакли

5 та суппозиторийлардан поливинилхлориддан ва полиэтилендан контур уяли ўрамда.

2 та контур уяли ўрамдан давлат ва рус тиллардаги тиббиётда қўлланилишга доир йўриқномаси билан бирга картон қўтига жойлаштирилади.

Сақлаш шароитлари

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин.
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати

3 йил.

Яроқлилик муддати ўтгандан сўнг қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Савдо маркази ва рўйхатдан ўтказилганлик

гвухномаси эгаси

Spey Medical Ltd., Буюк Британия

Ишлаб чиқарувчи

HELP S.A., Греция

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тиббий

махсулотни сифати бўйича эътирозлар (таклифлар)

ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили

"Ameliya Pharm Service" МЧЖ,

Ўзбекистон Республикаси, 100015, Тошкент ш.,

Ойбек кўч., 36

Тел: +998 71 150 50 81, 150 50 82

E-mail: ameliyapharm@gmail.com