

ПРОКТАЛУРОН

«MA'QULLANGAN»
O'zbekiston Respublikasi Sog'lom
saqlash vazirligi huzuridagi
Farmatsiye va tamog'in rivojlanish
agentligining «Dori vositalari, tibbiy buyumlar
valiboyi texnika ekspertiza» va
standartlashirish davlat markazi» DJK
11.10.2021 y. №19

ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА

Препаратнинг савдо номи:
Прокталурон

Таъсир этувчи модда (ХПН):
гиалурон кислотаси

Дори шакли:
ректал суппозиторийлар

Таркиби:
Ҳар бир суппозиторий қўйидагиларни сақлайди:
Натрий гиалуронати
(гиалуроник кислотага эквивалент 5 мг) 5,90 мг
Massa suppositoaria
(қаттиқ ёғ/ярим синтетик глицеридлар) 1847,70 мг
Осиё центелласи мойли экстракти 20,00 мг
Мой эритмалли аллоэ экстракти 60,00 мг
Календула мой экстракти 60,00 мг
Чой дарахти эфир мойи 2,00 мг
Бутилланган гидрокситолуол (БГТ) 0,40 мг
Пропилпарагидроксibenзоат 1,00 мг
Изобутилпарагидроксibenзоат 1,00 мг
Бутилпарагидроксibenзоат 2,00 мг

Таърифи:
оқ ёки деярли оқ рангли ҳидсиз суппозиторийлар.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Тўқималарнинг трофизми
ва регенерациясини стимулятори.
Код АТХ: C05AX

Фармакологик хусусиятлари
Фармакодинамикаси
Таъсир механизми

Гиалурон кислотаси ҳужайралараро боғловчи
тўқиманинг муҳим компоненти бўлган табиий полимер
мукополисахарид ҳисобланади. Унинг физика ва кимёвий
хусусиятлари бошқа молекулалар ва ҳужайралар билан
ўзаро таъсирга ёрдам беради, бу гиалурон
кислотасининг биологик жараёнларни бир қатордаги
иштирокини жуда ҳам муҳим қилади. Гиалурон
кислотаси молекулалар билан реакцияга киришади ва
терининг тонусини ва эгилувчанлигини қўллаб туришда
муҳим роль ўйнайди. Гиалурон кислотаси протео-
гликанларнинг ҳужайралари билан ҳамкорликда
боғловчи тўқиманинг ҳужайралараро массасини
стабиллаштиради. Жароҳатланиш соҳасида гиалурон
кислотасининг физик-кимёвий хусусиятлари битишга
қўл кўмак берувчи физиологик шароитларни яратади.
Аноректал каналнинг шиллиғини тез тиклаш учун қўллаб-
қувватлаш омили ҳисобланади.

Қўлланилиши

Жаррохлик аралашувдан кейин аноректал каналнинг
тикланиши учун, ички ва ташқи геморройда, орқа
тешикнинг яллиғланишида (шу жумладан ёриқларда ва
орқа тешик оқма тешиқларида), шунингдек простата
саратонини даволашда радиация муолажасидан кейин
қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Ректал. Қўллаш муддати одатда 30 кунни ташкил
қилади, аммо шифокорнинг кўрсатмаларига биноан
узайтирилиши мумкин.

Киришдан аввал қўлларни ювиш, ректал шамчаларни
бўшастиш (ўрамни қайчи билан кесиш) керак бўлади.
Ректал шамчаларни орқа тешикка тозаловчи клизмадан
ёки ичакнинг беихтиёр бўшалишидан кейин киритиш
афзалроқ бўлади. Агар ректал шамчалар жуда юмшоқ
бўлса, уларни дастлаб бир неча дақиқа давомида
музлатигида совутиш ёки совуқ сув остида ушлаб туриш
(уларни пластик ўрамдан чиқариб олгунча) керак бўлади.
Одатий дозалаш кунига битта ректал шамча, кечаси
уйкуга кетишдан аввал (ёки шифокорнинг кўрсатмасига
кўра). Ичга қабул қилиш мумкин эмас.

Ножўя таъсирлар

Жиддий ножўя таъсирлар қайд этилмаган.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препарат компонентларига юқори сезувчанликда қўллаш
мумкин эмас.

Дориларнинг ўзаро таъсири
Музатилмаган.

Махсус кўрсатмалар

Маҳаллий қўллаш учун мўлжалланган воситанинг узоқ
вақт қўлланилишида гиперсезувчанлик симптомлари
ривожланиши мумкин, бундай вазиятда даволашни
тўхтатиш ва шифокор билан маслаҳатлашиш керак.
Қўзларга тушиб қолишдан сақланинг.

Ҳомиладорлик ва лактация даврида қўлланилиши

Ҳомиладорликда қўллаш тажрибасининг етишмаслиги
муносабати билан Прокталурон ректал шамчаларини
фақат шифокорнинг тавсияси бўйича қўллаш керак.

Автомобилни ва мураккаб механизмларни
бошқариш қобилиятига таъсири Автотранспорт
воситаларини ёки потенциал хавфли механизмларни
бошқаришда пациентдаги қобилиятга таъсир қилмайди.

Чиқарилиш шакли

5 ректал суппозиторийлардан поливинилхлорид ва
полиэтиленли контур уяли ўрамда.
2 контур уяли ўрам давлат ва рус тиллардаги тиббиётла
қўлланилишига доир йўриқномаси билан картон қутига
жойлаштирилади.

Сақлаш шароитлари

Қуруқ, ёруғликдан ҳимояланган жойда 25°C дан юқори
бўлмаган ҳароратда сақлансин.
Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати

3 йил.
Яроқлилик муддати ўтгандан сўнг қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецепт бўйича.

Савдо маркаси ва рўйхатдан ўтказилганлик
гувоҳномаси эгаси
Spey Medical Ltd., Буюк Британия

Ишлаб чиқарувчи

HELP S.A.
10 Valaoritou Str., GR 14452 Metamorphosis, Attica, Греция
Т.: (0030) 2102815353
Факс: (0030) 2102811850

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тиббий
маҳсулотни сифати бўйича эътирозлар (таклифлар)
ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили

“Ameliya Pharm Service” МЧЖ,
Ўзбекистон Респуликаси, 100015, Тошкент ш.,
Ойбек кўчаси 36, «EAST LINE» БМ
Тел: +998 71 150 50 81; +998 71 150 50 82;
E-mail: uzdrugsafety@evolet.co.uk